

ESE ALEJANDRO PROSPERO REVEREND

ANALISIS DE MORBILIDAD POR SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION Y URGENCIAS

PRIMER TRIMESTRE 2024

Contenido

1.

INTRODUCCIÓN

2

2.

CONSULTA EXTERNA

3

2.1.

Primera Infancia

3

2.2.

Infancia

4

2.3.

Adolescencia

4

2.4.

Juventud

5

2.5.

Adultez

5

2.6.

Vejez

6

3.

HOSPITALIZACIÓN

6

4.

URGENCIAS

7

4.1.

Primera Infancia

7

4.2.

Infancia

¡Error! Marcador no definido.

4.3.

Adolescencia

¡Error! Marcador no definido.

4.4.

Juventud

¡Error! Marcador no definido.

4.5.

Adultez

¡Error! Marcador no definido.

4.6.

Vejez

¡Error! Marcador no definido.

1. INTRODUCCIÓN

Principales Causas de Morbilidad atendida

Se realizó un análisis de las consultas médicas efectuadas durante el primer trimestre del año 2024 en las distintas unidades de atención de salud de la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend basado en los registros individuales de servicios RIPS, que contienen información detallada sobre el número y las características de consultas médicas.


Durante el primer trimestre del año 2024, se realizaron un total de 98.033 atenciones médicas de las cuales 85.471 (87,2%) fueron en el servicio de Consulta Externa, 8 (0,01%) en el servicio de hospitalización y 12.554 (12,8%) en el servicio de urgencias. (véase tabla 1). el ciclo vital Adultez de 29 a 59 años presenta mayor carga de morbilidad aportando el 33,8% de las atenciones médicas realizadas durante este primer trimestre, en segundo lugar, Juventud representa el 18.7 % de las atenciones reportadas y en tercer lugar Primera infancia representa el 17 %. En la tabla 1. Se observa que la mayoría de los pacientes se encuentran en los grupos de adultez, juventud, primera infancia. La consulta externa es el servicio más utilizado por los pacientes en todos los grupos de edad, mientras que la hospitalización es menos común. Es relevante destacar que se han identificado pacientes adolescentes en urgencias, lo que resalta la importancia de considerar las necesidades específicas de cada grupo etario para una atención diferenciada y efectiva.

Tabla 1. Atenciones primer trimestre por Servicio y por ciclo de vida

Ciclo de Vida	Consulta Externa n (%)	Hospitalización n (%)	Urgencias n (%)	Total n (%)
Primera Infancia	15317 (15,6)	0 (0)	1387 (1,4)	16704 (17,0)
Infancia	6424 (6,6)	0 (0)	1012 (1,0)	7436 (7,6)
Adolescencia	6585 (6,7)	3 (0,003)	1087 (1,1)	7675 (7,8)
Juventud	15724 (16,0)	0 (0)	2620 (2,7)	18344 (18,7)
Adultez	28254 (28,8)	2 (0,002)	4872 (5,0)	33128 (33,8)
Vejez	13167 (13,4)	3 (0,003)	1576 (1,6)	14746 (15,0)
total	85471 (87,2)	8 (0,008)	12554 (12,8)	98033


Fuente: Rips ESE ALPROREV Primer Semestre 2024 - Oficina sistemas

Ilustración 1. Representación porcentual de las atenciones médicas realizadas por servicios en el primer trimestre 2024




Fuente: Rips ESE ALPROREV Primer Trimestre 2024 - Oficina sistemas

Ilustración 2. Pirámide poblacional de las atenciones en Consulta Externa – Primer trimestre 2024



Fuente: Rips ESE ALPROREV Primer Trimestre 2024 - Oficina sistemas

Ilustración 3. Pirámide poblacional de las atenciones en Urgencias – Primer trimestre 2024



Fuente: Rips ESE ALPROREV Primer Trimestre 2024 - Oficina sistemas

2. CONSULTA EXTERNA

2.1. Primera Infancia

Se reportaron 15.317 (17,9%) de atenciones por consulta externa en el curso de vida primera infancia del total de las atenciones en este servicio (85.471 registros), la tabla 2 muestra las primeras 10 causas de morbilidad en este ciclo de vida.

Tabla 4. Primeras 10 causas de morbilidad en primera infancia en el Servicio de Consulta Externa

Primera Infancia	N (%)
RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	525 (48,3)
PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	219 (20,1)
INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	78 (7,2)
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	67 (6,2)
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	51 (5,4)
ALERGIA NO ESPECIFICADA	35 (3,2)
DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	31 (2,9)
ESCABIOSIS	30 (2,8)
PITIRIASIS VERSICOLOR	27 (2,5)
IMPETIGO [CUALQUIER SITIO ANATOMICO] [CUALQUIER ORGANISMO]	24 (2,2)
total	1087

Fuente: Rips ESE ALPROREV Primer Trimestre 2024 - Oficina sistemas

En el análisis epidemiológico de las atenciones por consulta externa en el ciclo de vida de primera infancia, se destaca que representan el 17,9% del total de atenciones en este servicio. La tabla muestra las primeras 10 causas de morbilidad en este grupo. Entre estas, la rinofaringitis aguda (resfriado común) es la más prevalente, con un 48,3% de los casos. Además, las parasitosis intestinales sin otra especificación y las infecciones agudas no especificadas de las vías respiratorias inferiores también son relevantes. Estos datos resaltan la importancia de abordar estas condiciones de salud en la atención a niños en consulta externa.

2.2. Infancia

Tabla 5. Primeras 10 causas de morbilidad en infancia en el Servicio de Consulta Externa

Infancia	n (%)
PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	178 (11,9)
RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	150 (10,0)
ALERGIA NO ESPECIFICADA	37 (2,5)
INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	36 (2,4)
PITIRIASIS VERSICOLOR	30 (2,0)
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	26 (1,7)
MIOPIA	26 (1,7)
DERMATITIS ATOPICA, NO ESPECIFICADA	21 (1,4)
VERRUGAS VIRICAS	18 (1,2)
HIPERTROFIA DE LAS ADENOIDES	16 (1,1)
total	1501

Fuente: Rips ESE ALPROREV Primer Trimestre 2024 - Oficina sistemas

En el análisis epidemiológico de las atenciones por consulta externa en el grupo de infancia, se destaca que las parasitosis intestinales sin otra especificación representan el 11,9% de los casos, seguidas por el resfriado común (rinofaringitis aguda) con un 10,0%. Estas condiciones son relevantes en la salud de los niños en esta etapa.

2.3. Adolescencia

Tabla 6. Primeras 10 causas de morbilidad en infancia en el Servicio de Consulta Externa

Adolescencia	n (%)
PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	92 (23,2)
RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	63 (15,9)
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	52 (13,1)
VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS	35 (8,8)
LUMBAGO NO ESPECIFICADO	30 (7,6)
GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	30 (7,6)
ACNE, NO ESPECIFICADO	29 (7,3)
MIOPIA	24 (6,1)
PITIRIASIS VERSICOLOR	22 (5,6)
TIÑA DEL CUERPO [TINEA CORPORIS]	19 (4,8)
total	396

Fuente: Rips ESE ALPROREV Primer Trimestre 2024 - Oficina sistemas

2.4. Juventud

En el análisis de morbilidad en consulta externa para el grupo de adolescencia, se destaca que las parasitosis intestinales sin otra especificación representan el 23,2% de los casos, seguidas por el resfriado común (rinofaringitis aguda) con un 10,0%. Estas condiciones son relevantes en la salud de los adolescentes y deben ser consideradas en la atención médica. Además, se observan otras afecciones como infecciones urinarias, vaginitis, lumbago y dermatitis, que también requieren atención diferenciada. Este análisis proporciona información valiosa para la toma de decisiones clínicas y la prevención de enfermedades en esta población.

Tabla 7. Primeras 10 causas de morbilidad en juventud en el Servicio de Consulta Externa

Juventud	n (%)
VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	179 (24,4)
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	124 (16,9)
LUMBAGO NO ESPECIFICADO	95 (12,9)
PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	64 (8,7)
SINDROME DEL COLON IRRITABLE SIN DIARREA	57 (7,8)
RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	51 (6,9)
SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	48 (6,5)
MIGRAÑA, NO ESPECIFICADA	43 (5,9)
GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	37 (5,0)
EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO	37 (5,0)
total	735

Fuente: Rips ESE ALPROREV Primer Trimestre 2024 - Oficina sistemas

2.5. Adultez

Tabla 8. Primeras 10 causas de morbilidad en adultez en el Servicio de Consulta Externa

Adultez	n (%)
HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	1724 (45,1)
LUMBAGO NO ESPECIFICADO	436 (11,9)
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	361 (9,4)
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	352 (9,2)
VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	251 (6,6)
SINDROME DEL COLON IRRITABLE SIN DIARREA	203 (5,3)
RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	141 (3,7)
LUMBAGO CON CIATICA	137 (3,6)
GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	113 (3,0)
LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION	108 (2,8)
total	3826

Fuente: Rips ESE ALPROREV Primer Trimestre 2024 - Oficina sistemas

En el análisis de morbilidad en consulta externa para el grupo de adultez, se destaca que la hipertensión esencial (primaria) representa el 45,1% de los casos, seguida por el lumbago no especificado con un 11,9%. Además, se observan otras condiciones como diabetes mellitus no insulino dependiente, infecciones urinarias, vaginitis y síndrome del colon irritable, que también

requieren atención diferenciada. Estos datos proporcionan información relevante para la toma de decisiones clínicas en esta población.

2.6. Vejez

Ilustración 9. Primeras 10 causas de morbilidad en vejez en el Servicio de Consulta Externa

Adultez	n (%)
HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	3391 (78,3)
LUMBAGO NO ESPECIFICADO	196 (4,5)
ENFERMEDAD RENAL HIPERTENSIVA SIN INSUFICIENCIA RENAL	138 (3,2)
DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION	124 (2,9)
OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS	122 (2,8)
DISMINUCION INDETERMINADA DE LA AGUDEZA VISUAL EN AMBOS OJOS	106 (2,4)
MAREO Y DESVANECIMIENTO	78 (1,8)
OTRAS DIABETES MELLITUS ESPECIFICADAS SIN MENCION DE COMPLICACION	67 (1,5)
CATARATA, NO ESPECIFICADA	62 (1,4)
HIPERCOLESTEROLEMIA PURA	49 (1,1)
total	4333

Fuente: Rips ESE ALPROREV Primer Trimestre 2024 - Oficina sistemas

En el análisis comparativo de morbilidad en consulta externa para diferentes grupos etarios, se observan patrones distintos: en primera infancia, predominan las infecciones respiratorias y las parasitosis intestinales; en infancia, se mantiene el enfoque en el resfriado común y las infecciones urinarias; en adolescencia, aparecen condiciones específicas como vaginitis y migraña; y en adultez, la hipertensión esencial es la más prevalente, seguida por otras afecciones como lumbago, diabetes mellitus y gastritis. Cada grupo etario presenta una combinación única de condiciones médicas, lo que subraya la importancia de adaptar la atención médica a las necesidades específicas de cada población.

3. HOSPITALIZACIÓN

Durante el primer trimestre de 2024, la Clínica La Castellana registró un total de 8 casos en su servicio de hospitalización. Las principales causas de atención incluyeron heridas no especificadas del cuerpo (50 %), heridas en el brazo (25 %) y otras estrecheces uretrales (12.5 %). Sin embargo, la baja ocupación de las camas de hospitalización es motivo de preocupación y debe ser abordada para garantizar una atención adecuada a los pacientes. Véase tabla 8.

Tabla 10. Diagnósticos principales en el servicio de Hospitalización.


Diagnósticos Hospitalización	N (%)
HERIDA DE REGION NO ESPECIFICADA DEL CUERPO	4 (50,0)
HERIDA DEL BRAZO	2 (25,0)
OTRAS ESTRECHECES URETRALES	1 (12,5)
EFFECTOS ADVERSOS DE ANTIBIOTICO SISTEMICO NO ESPECIFICADO	1 (12,5)
total	8

Fuente: Rips ESE ALPROREV Primer Trimestre 2024 - Oficina sistemas

4. URGENCIAS


4.1. Urgencias Pediátricas

Ilustración 11. Principales diagnósticos en el servicio de urgencias en población pediátrica durante el primer trimestre



El análisis descriptivo epidemiológico de los datos de primera infancia en urgencias revela una distribución de casos variada. La rinoфарингитis aguda (resfriado común) presenta 129 casos, lo que equivale a aproximadamente el 24.7%. Le sigue la infección aguda de las vías respiratorias inferiores con 106 casos, representando cerca del 20.3%. Además, se registraron 111 casos de diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (aproximadamente el 21.2%), 103 casos de infección viral no especificada (alrededor del 19.7%), 84 casos de colitis y gastroenteritis no infecciosas, no especificadas (cerca del 16.1%), 83 casos de alergia no especificada (aproximadamente el 15.9%), 68 casos de mordedura o ataque de perro (alrededor del 13.0%), 65 casos de asma (representando cerca del 12.5%), y 56 casos de amigdalitis aguda (aproximadamente el 10.7%). Estos datos proporcionan una visión general de las condiciones más comunes en esta población y pueden ser útiles para la planificación y mejora de los servicios de salud infantil.

Urgencias Adultos



La hipertensión esencial (primaria) presenta 373 casos, lo que representa aproximadamente el 22.9% del total de casos. Le sigue el cólico renal, no especificado con 539 casos, alrededor del 33.2%. Además, se registraron 237 casos de lumbago no especificado (aproximadamente el 14.6%), 200 casos de diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (cerca del 12.3%), 182 casos de colitis y gastroenteritis no infecciosas, no especificadas (alrededor del 11.2%), 165 casos de herida de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s) (representando cerca del 10.2%), 165 casos de infección de vías urinarias, sitio no especificado (aproximadamente el 10.2%), 145 casos de gastritis, no especificada (alrededor del 8.9%), y 131 casos de alergia no especificada (cerca del 8.1%). Además, se reportaron 128 casos de fiebre, no especificada. Estos datos proporcionan una visión general de las condiciones más comunes en la población adulta y pueden ser útiles para la planificación y mejora de los servicios de salud.